

⑫

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

⑲ Anmeldenummer: 81100021.5

⑳ Anmeldetag: 05.01.81

⑤ Int. Cl.<sup>3</sup>: **C 07 C 33/20, C 07 D 265/30,**  
**C 07 B 19/00, C 12 P 7/16,**  
**A 01 N 43/84**

③① Priorität: 16.01.80 DE 3001303

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung: 29.07.81  
Patentblatt 81/30


⑥④ Benannte Vertragsstaaten: BE DE FR GB IT NL

⑦① Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft,**  
**Carl-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen (DE)**

⑦② Erfinder: **Martin, Christoph, Dr., Kolpingstrasse 6,**  
**D-6800 Mannheim (DE)**  
Erfinder: **Himmele, Walter, Dr., Eichenweg 14,**  
**D-6909 Walldorf (DE)**  
Erfinder: **Siegel, Hardo, Dr., Hans-Purmann-Allee 25,**  
**D-6720 Speyer (DE)**

⑤④ **Optisch aktive Phenylpropan-Derivate, ihre Herstellung und Verwendung zur Herstellung von Fungiziden.**

⑤⑦ Die vorliegende Erfindung betrifft S-konfigurierte Phenylpropan-Derivate der Formel



worin

R¹ eine Alkyl-, Aryl oder Alkoxygruppe,

R² ein Wasserstoffatom oder dasselbe wie R¹ und


R³ ein gegebenenfalls verestertes Carboxi, ein acetalisiertes Formyl oder ein gegebenenfalls verestertes Hydroximethyl bedeuten, deren Herstellung durch mikrobiologische Hydrierung sowie deren Verwendung zur Herstellung fungizid wirksamer Verbindungen.

**EP 0 032 659 A1**

Optische aktive Phenylpropan-Derivate, ihre Herstellung  
und Verwendung zur Herstellung von Fungiziden

- Die vorliegende Erfindung betrifft neue optisch aktive  
5 Phenylpropan-Derivate, ihre Herstellung und ihre Verwen-  
dung zur Herstellung fungizid wirksamer Verbindungen.

- Fungizid wirksame Phenylpropan-Derivate sind bereits be-  
kannt (vgl. DE-OS 2 656 747, DE-OS 2 750 016 und  
10 DE-OS 2 752 135). Als besonders wirksam hat sich das  
1-[3-(p-tert.-Butylphenyl)-2-methyl]-cis-3,5-dimethyl-  
morpholin I




- erwiesen (vgl. DE-OS 2 656 747, Anspruch 3), welches ein  
20 asymmetrisches Kohlenstoffatom besitzt. Das (-)-Enantiomere  
dieser Verbindung übertrifft das Racemat in seiner Wirkung.  
Das Racemat (I) läßt sich in bekannter Weise, z.B. durch  
Umsetzen mit (+)-Camphersulfonsäure in einem Verdünnungs-  
mittel, anschließender Trennung der diastereomeren Salze  
25 durch fraktionierte Kristallisation und Umsetzung des das  
(-)-Enantiomere enthaltenden Salzes mit einer starken Base  
herstellen (vgl. die noch nicht offengelegte deutsche  
Patentanmeldung P 29 07 614.0 vom 27.02.1979). Dieses Ver-  
fahren zur Enantiomerentrennung ist jedoch aufwendig, außer-  
30 dem muß das in der Mutterlauge noch enthaltene (+)-Enantio-  
mere racemisiert werden, damit es wieder zur Enantiomeren-  
trennung eingesetzt werden kann.

- Es wurde nun gefunden, daß das (-)-Enantiomere ausgehend  
35 von einer entsprechenden optisch aktiven Vorstufe auf ein-  
WK/BL

fache Weise synthetisiert werden kann, ohne daß dabei das unerwünschte (+)-Enantiomere entsteht.

Gegenstand der Erfindung sind S-konfigurierte Phenylpropan-  
5 -Derivate der Formel II



worin

R<sup>1</sup> eine Alkyl-, Aryl- oder Alkoxygruppe,

15 R<sup>2</sup> ein Wasserstoffatom oder dasselbe wie R<sup>1</sup> und

R<sup>3</sup> eine gegebenenfalls verestertes Carboxi, ein acetalisiertes Formyl oder ein gegebenenfalls verestertes Hydroximethyl  
bedeuten.

20

Als Bedeutungen für R<sup>1</sup> sind z.B. als Alkylgruppen solche mit 1-4 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise die tert.-Butylgruppen, als Arylgruppe der Phenylrest und als Alkoxygruppen solche mit 1-4 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise der tert.-Butoxirest, zu nennen.

25


R<sup>2</sup> ist vorzugsweise Wasserstoff

R<sup>3</sup> ist vorzugsweise Formyl, Formyldimethylacetal, Formylethylenglykolacetal, Formylneopentylglykolacetal oder  
30 Acetoximethyl.

30

Gegenstand der Erfindung ist weiter ein Verfahren zur Herstellung der (S)-Verbindungen der Formel II, welches darin besteht, daß man eine Verbindung der Formel III

35



10 worin R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> dasselbe wie oben bedeuten und  
R<sup>4</sup> eine CHO-Gruppe oder dasselbe wie R<sup>3</sup>  
bedeuten, mikrobiologisch hydriert.

15 Die mikrobiologische Hydrierung läßt sich mit aeroben oder  
fakultativ aeroben Mikroorganismen durchführen. Als Mikro-  
organismus eignet sich insbesondere *Saccharomyces*  
*cerevisiae* (Preßhefe, Bierhefe, Backhefe). Weiter kommen  
in Betracht: Hefen der Gattungen *Candida*, *Rhodotorula*,  
20 *Torulopsis*, Pilze der Gattungen *Absidia*, *Aspergillus*,  
*Curvularia*, *Cylindrocarpon*, *Mucor*, *Penicillium*, *Rhizopus*,  
*Phycomyces*, *Geotrichum*, *Gibberella*, *Gliocladium* und Bakte-  
rien der Gattungen *Bacillus*, *Micrococcus*, *Mycobacterium*,  
25 *Pediococcus*, *Proactinomyces*, *Propionibacterium*, *Pseudo-*  
*nomas*, *Serratia*, *Streptococcus*, *Streptomyces*.

25 Diese Mikroorganismen können leicht aus Boden- oder Wasser-  
proben in bekannter Weise gewonnen werden.

30 Der Mikroorganismus kann vor der Verwendung zur Fermenta-  
tion angezüchtet sein; die Anzucht erfolgt in der Regel in  
an sich bekannter Weise in einem wäßrigen Medium unter  
Zuhilfenahme der üblichen Nährstoffe. Manchmal ist es  
zweckmäßig, das Anzuchtmedium für die Fermentation zu  
verwenden, obwohl die Zusammensetzung des Fermentations-  
mediums wesentlich einfacher sein kann.

- Die Fermentation ist ohne weitere Zusätze allein mit dem Edukt (Ausgangsmaterial) und dem Mikroorganismus durchführbar. Es ist jedoch vorteilhaft, dem wäßrigen Medium eine assimilierbare Kohlenstoffquelle als Nährstoff zuzusetzen, vorzugsweise in einer Konzentration von 10 - 100 g pro Liter, beispielsweise in Form eines Zuckers, damit der Mikroorganismus möglichst lange aktiv bleibt. Der Zusatz einer Stickstoffquelle ist nicht notwendig; gegebenenfalls kann aber eine assimilierbare Stickstoffquelle zugesetzt werden, vorzugsweise in einer Menge von etwa 1 - 50 g pro Liter. Das Fermentationsmedium kann ferner auch anorganische Salze und andere wachstumsfördernde Substanzen wie Vitamine enthalten.
- Der pH-Wert der Fermentation soll vorzugsweise innerhalb des Bereichs von 2 bis 10, insbesondere 3 - 8 liegen, ein Bereich, der zumeist ohne besondere Zusätze erreichbar ist. Die Temperatur kann in weitem Rahmen schwanken, z.B. zwischen 10°C und 40°C, wobei eine Temperatur von 20 - 35°C bevorzugt ist. Zur Erzielung optimaler Ausbeuten ist es vorteilhaft, daß das Edukt in der Gärbrühe in einer Konzentration von 0,1 - 5 % vorliegt. Nach erfolgter Reduktion kann erneut Edukt zugesetzt werden. Dieses Verfahren läßt sich bis zur Inaktivierung der Mikroorganismen wiederholen.


Die Fermentationsdauer ist von dem verwendeten Mikroorganismus abhängig. Sie schwankt zwischen 5 und 200 Stunden; bei mehrmaliger Eduktzugabe kann sich die Fermentationszeit entsprechend verlängern.

Die Fermentation wird vorzugsweise aerob durchgeführt, z.B. unter Rühren, Schütteln unter Luftzutritt oder mittels einer Belüftungsvorrichtung. Vorzugsweise verwendet

man einen Mikroorganismus, der sich in nicht wachsender (stationärer) Phase verwendet. Neben frisch hergestellter Zellmasse können auch getrocknete oder lyophilisierte Zellen verwendet werden. Bei der mikrobiologischen Hydrierung wird eine gegebenenfalls vorhandene Aldehydgruppe ( $R^4 = \text{CHO}$ ) zur Hydroxymethylgruppe mitreduziert.

Die glatte Hydrierung substituierter Zimtaldehyde ist überraschend, da ungesättigte Methylphenylpropan-Derivate normalerweise völlig inert gegen einen mikrobiellen Angriff sind oder aber decarboxiliert werden (vgl. Chem. Abstr. 91, 290; 35422 u.).

Die Verbindungen II lassen sich in die entsprechenden Tosylate oder Halogenderivate überführen, welche nach Umsetzung mit Aminen wie cis-Dimethylmorpholin Verbindungen der Formel IV



25 worin  $R^1$  und  $R^2$  die angegebene Bedeutung besitzen, bilden, die hochwirksame Fungizide darstellen (vgl. DE-OS 26 56 747, DE-OS 27 52 096).

#### Beispiel 1

30

(S)-3-(p-tert.-Butylphenyl)-2-methyl-propanol-(1)

Ein sauberer, nicht sterilisierter Fermenter mit 6-l-Gesamtvolumen wird folgendermaßen beschickt:

35

	vollentsalztes Wasser	1,8 l
	Saccharose	90 g
	Presshefe (Deutsche Hefewerke)	200 g
	3-(p-tert.-Butylphenyl)-2-methyl-	
5	-2-propen-1-al	8 g in 30 ml Ethanol
	Silicon-Antischaummittel	2 g

Fermentationsbedingungen sind:

	Temperatur:	30°C
10	Drehzahl des Rührers:	500 U/min
	Belüftungsrate:	1 VVM
	Fermentationszeit:	52,5 h

Die Fermentation wird nach 52,5 h abgebrochen. Die Zell-  
15 masse wird durch Zentrifugation von der Nährlösung ge-  
trennt; beide Phasen werden je 3mal mit Methylenchlorid  
extrahiert. Die vereinigten Extrakte werden über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  
getrocknet und im Vakuum eingedampft. Der Rückstand wird  
destilliert. Ausbeute an (S)-3-(p-tert.-Butylphenyl)-2-  
20 -methylpropanol-1: 4,1 g (51 %).

$$[\alpha]_D^{20} = -7,54^\circ$$

Durch entsprechende Optimierung läßt sich die Ausbeute  
25 leicht steigern. Die optische Reinheit des Produkts wur-  
de mit Hilfe von NMR in Gegenwart von chiralen Verschie-  
bungsreagenzien, z.B. (Eu(hfbc)<sub>3</sub>) bestimmt. Das Produkt  
bestand nur aus einem Enantiomeren. Durch Umwandlung des  
Produkts zu (S)-1-[3-(p-tert.-Butylphenyl)-2-methylpropyl]-  
30 -cis-3,5-dimethylmorpholin konnte dem mikrobiellen Produkt  
die S-Konfiguration zugeordnet werden.

Beispiel 2

## 2-Methylzimtalkohol-Derivate

- 5 Ein auf 30°C temperierter Rundkolben wird folgendermaßen beschickt:

- 300 ml vollentsalztes Wasser  
50 g Saccharose  
10 30 g Trockenhefe (Deutsche Hefewerke)

- Der Ansatz wird mit 300 U/min gerührt. Nach einer Gärzeit von 15 Minuten wird 1,5 g Substrat zugegeben und weitere 24 Stunden inkubiert. Die gesamte Kulturbrühe wird  
15 anschließend 3mal mit Methylenchlorid extrahiert. Die organische Phase wird über  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  getrocknet und im Vakuum eingeengt.

Folgende Produkte wurden erhalten:





20

25

30


35



Edukt	Produkt
5	 28 %
10	 93 %
15	 82 %
20	 91 %
30	
35	

Patentansprüche

1. S-konfigurierte Phenylpropan-Derivate der Formel II



10  
worin

$R^1$  eine Alkyl-, Aryl- oder Alkoxygruppe,

$R^2$  ein Wasserstoffatom oder dasselbe wie  $R^1$  und


$R^3$  ein gegebenenfalls verestertes Carboxyl, ein acetalisiertes Formyl oder ein gegebenenfalls verestertes

15  
Hydroximethyl

bedeuten.

2. (S)-3-(p-tert.-Butylphenyl)-2-methyl-propanol.


- 20  
3. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel III



30  
worin  $R^1$  und  $R^2$  dasselbe wie oben bedeuten und  
 $R^4$  eine CHO-Gruppe oder dasselbe wie  $R^3$   
bedeuten, mikrobiologisch hydriert.

35

4. Verwendung der Verbindungen gemäß Anspruch 1 zur Herstellung von fungizid wirksamen s-konfigurierten Verbindungen der Formel



IV,

worin

$R^1$  und  $R^2$  die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung besitzen.



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0032659  
Nummer der Anmeldung

EP 81 10 0021.5

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
A	DE - A1 - 2 405 004 (HAARMANN & REIMER) * Anspruch 1 *	2	C 07 C 33/20 C 07 D 265/30 C 07 B 19/00 C 12 P 7/16 A 01 N 43/84
A	DE - A1 - 2 446 046 (I.C.I.) * Anspruch 1 *	4	
D, A	DE - A1 - 2 656 747 (BASF) * Anspruch 3 *	4	
P, A, D	EP - A1 - 0 014 999 (BASF) * Anspruch 1 * & DE - A1 - 2 907 614	4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.) A 01 N 43/84 C 07 B 19/00 C 07 C 33/20 C 07 C 43/205 C 07 C 43/30 C 07 C 69/00 C 07 D 265/30 C 12 P 7/16
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
Berlin	27-04-1981		KNAACK

EPA form 1503.1 06.78